

Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
Avdelningen för patologi och viltsjukdomar

Viltmästareförbundet
Jägareförbundet
Jägarnas riksförbund
Föreningen Svenska jägare
Svenska allmogejägarförbundet
Sveriges Jordägareförbund

Information om fågelinfluensa hos vilda fasaner och gräsänder

SVA har, i september i år, påvisat högpåtaglig fågelinfluensa av typen H5N8 i Södermanlands län hos frilevande gräsänder samt typen H5N1 hos frilevande fasaner i Skåne. Virusintroduktionerna till fåglarna antas i båda fallen ha orsakats av att virus kvarstått hos vilda fåglar och i miljön och inte en nyintroduktion från flyttfåglar. Under sommaren är förhållandena för virusöverlevnad sämre men trots det har fågelinfluensa påvisats hos vilda fåglar sporadiskt under perioden. Vinterhalvåret 2020-2021 var den värsta fågelinfluensaperioden hittills i Sverige både sett till antal utbrott på tama fåglar och antal fynd på vilda fåglar. Den höga förekomsten av virus bland vilda fåglar och i miljön har gjort att smittan har kvarstått längre än tidigare. Den utdragna fågelinfluenzasäsongen kan också bero på att virusstammen 2020/2021 har längre överlevnadstid i miljön jämfört med fågelinfluensaviruset som drabbade Sverige 2016/2017 enligt färskaste studier. Nu finns risk för nya infektioner hos vilda och tama fåglar när det kalla vädret kommer och solljuset succesivt minskar. Dessutom finns stor risk att flyttfåglarna som anländer till Sverige under hösten för med sig nya fågelinfluensavirus.

Rapportera om du ser sjuka eller döda fåglar

Genom att rapportera förekomst av sjuka och döda fåglar på rapporteravilt.sva.se och att skicka in döda fåglar till SVA hjälper man till i arbetet med att bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner och samtidigt bidrar man till SVA:s övervakning av andra sjukdomar.

Andfåglar kan i vissa fall bära på fågelinfluensaviruset och smitta andra arter utan att själva bli sjuka. Hönsfåglar så som fasaner och rapphöns är betydligt känsligare med högre risk för sjukdom och dödsfall.

Tänk på god hygien

För att begränsa smitta till tamfåglar och vilda utsatta bestånd är det viktigt att tänka på biosäkerheten i samband med jakt och annan hantering av utsatta fåglar. Tänk på att tvätta både utrustning, kläder, skor och eventuella hundar som används vid fågeljakt noggrant om man ska besöka olika fågeltäta platser. Tvätta först bort all synlig smuts från skor och utrustning, låt torka och använd därefter desinfektionsmedel. Kläder tvättas i 60 grader och torktumlas med fördel efteråt. Noggrann rengöring är extra viktigt efter fågeljakt om man har egna fjäderfän hemma, om man ska besöka en fjäderfäbesättning eller om man åker mellan gårdar och områden för att jaga eller hjälpa till vid fågeljakt.

Vid hantering av självdöda, vilda fåglar bör man använda handskar, eller vränga en plastsäck/plastpåse om djuret, för att undvika direktkontakt. Tänk på god hygien och att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, gärna utomhus. Om det finns misstanke om fågelinfluensa är det lämpligt att tillämpa en karens på 48 timmar mellan hantering av självdöda fåglar och besök på en fjäderfäanläggning eller fågeltäta platser.

Det finns många olika varianter av fågelinfluensa. Risken att den högpatogeta fågelinfluensa som har förekommit i Europa under de senaste åren skulle kunna smitta människa bedöms vara låg. Den typ av fågelinfluensa H5N1 som konstaterats i Sverige och Europa under 2021 ska inte förväxlas med H5N1 som påvisades i Sverige 2006-2007 som innebar högre risker för människor. Om du upplever luftvägssymtom efter att hanterat en fågel med konstaterad fågelinfluensa rekommenderar folkhälsomyndigheten att du ska informera vården.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta SVA på 018-67 40 00

Mer information

[Webbnyhet om fågelinfluensa på fasaner i Skåne](#)

[SVA:s information om fågelinfluensa](#)

[SVA - Karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar](#)

[Jordbruksverkets information om fågelinfluensa](#)

[Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt \(sva.se\)](#)